



ОВСЮГЕН ЭКСПРЕСС, ЕС

CAS: 71283-80-2 + 99607-70-2
 $C_{18}H_{16}ClNO_5$; $C_{18}H_{22}ClNO_3$

20L

Fenoxaprop-P-ethyl, 140 g/l + Cloquintose-t-mexil, 35 g/l EC

ЗОРИУЛАЛТ

Зөвхөн үр тарианы тарималын нэг наст үет хог ургамлыг устгах сонгомол үйлчилгээтэй гербицид.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ

- Тарианы хогт хольц цэвэршиж буудайн таваарлаг чанарыг сайжруулна.
- Нэг наст үет хог ургамлыг цухуйснаас эхлэн бутлалтын төгсгөл хүртэлх хугацаанд шүршинэ.
- Нэг наст үет хог ургамалыг 10-14 хоногт бүрэн устгана.

ДАВУУ ТАЛ

- Ихэнх нэг наст үет хог ургамлыг 2 навчтай болсноос эхлэн цацах.
- Эх уусмалыг ажлын уусмалтай найруулахаас 1-2 цагийн өмнө бэлтгэх
- Өөр бусад гербицид, фунгицид, өсөлт идэвхижүүлэгчидтэй нийлэмжтэй.
- Хэт халуун /+25-°C-ээс их/, бороо орохоос өмнө болон дараа 3 цагийн дотор цацаж болохгүй.
- Сонгомол үйлчилгээтэй тул бэлдмэлийн савыг сайтар цэвэрлэх, аль болох гербицидүүдийн өмнө цацахыг эрмэлзэх хэрэгтэй.



**БОДИСЫГ ХЭРЭГЛЭСНИЙ ДАРАА САВЫГ ХҮНСНИЙ
ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.**

ХЭРЭГЛЭХ НОРМ ТҮН

Таримал	Хөнөөлт организм	Тун (л/га)	Ажлын уусмал (л)	Хугацаа
Улаанбуудай	Ногоон хоног будаа	0.4	Газрын техникээр 150-200 Онгоцоор 25-50	Нэг наст үет хог ургамлыг 2 навчтай байх үеэс бутлалтын төгсгөл гол хатгалт хүртэлх хугацаанд шүршиж хэрэглэнэ.
Улаанбуудай, арвай	Нэг наст үет хог ургамал Тарианы хар будаа, зэрлэг бог болон хонгио хошуу будаа	0.4-0.6		



ХАДГАЛАХ:
-15°C/ - /+30°C/-д 2 жил хадгална.

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ:
SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

ЗАХИАЛАГЧ:
Агромаштех” ХХК

ХОЛБОО БАРИХ:
70375059, 89006221, 98986715

